【11-1】FEC100

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	6

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5-FU	500mg/m^2	点滴静注	●																				
エピルビシン(EPI)	100mg/m^2	点滴静注	●																				
エンドキサン(CPA)	500mg/m^2	点滴静注	●																				

【11-2】weekly PAC

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで(術前・術後:12)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7
パクリタキセル(PAC)	80mg/m^2	点滴静注	●						

【11-4】DOC

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで(術前・術後:4)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル(DOC)	75mg/m^2	点滴静注	●																				

【11-6】Cap B

適用目的	術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで(術後:8)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゼローダ(Cap)	2500mg/m^2	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

【11-7】S-1

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ティーエスワン(S-1)	80mg/m^2	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
↓副作用発現状況に応じて2投1休																																												
ティーエスワン(S-1)	80mg/m^2	内服	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							

【11-8】≪TC≫DOC+CPA

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで(術前・術後:4)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル(DOC)	75mg/m^2	点滴静注	●																				
エンドキサン(CPA)	600mg/m^2	点滴静注	●																				

【11-9】VNR

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ロゼウス(VNR)	25mg/m^2	点滴静注	●							●													

【11-10】Tmab+weekly PAC

適用目的	術前・術後・進行再発1st line
施行ｸｰﾙ数	PDまで(術前・術後:18(PAC併用は4))

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブBS(Tmab)	6(初回8)mg/kg	点滴静注	●																				
パクリタキセル(PAC)	80mg/m^2	点滴静注	●							●							●						

【11-12】Tmab+VNR

適用目的	進行再発1st line
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブBS（Tmab）	6（初回8）mg/kg	点滴静注	●																				
ロゼウス（VNR）	25mg/m^2	点滴静注	●							●													

【11-13】Lap+Cap

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
タイケルブ（Lap）	1250mg	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゼローダ（Cap）	2000mg/m^2	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

【11-14】ABI

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン（ABI）	260mg/m^2	点滴静注	●																				

【11-16】GEM

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール（GEM）	1250mg/m^2	点滴静注	●							●													

【11-17】ハラヴェン

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハラヴェン	1.4mg/m^2	点滴静注	●							●													

【11-18】Tmab+DOC

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで（術前・術後：4）

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル（DOC）	75mg/m^2	点滴静注	●																				
トラスツズマブBS（Tmab）	6（初回8）mg/kg	点滴静注	●																				

【11-19】PAC+Bev

適用目的	進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル（PAC）	90mg/m^2	点滴静注	●							●							●													
アバスチン（Bev）	10mg/kg	点滴静注	●														●													

【11-20】EC

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	6

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エピルビシン（EPI）	90mg/m^2	点滴静注	●																				
エンドキサン（CPA）	600mg/m^2	点滴静注	●																				

【11-21】PER+Tmab+DOC

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行クール数	PDまで（術前・術後：18（DOC併用は4））

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パージェタ（PER）	420（初回840）mg	点滴静注	●																				
トラスツズマブBS（Tmab）	6（初回8）mg/kg	点滴静注	●																				
ドセタキセル（DOC）	75mg/m^2	点滴静注	●																				

【11-22】PER+Tmab+PAC

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行クール数	PDまで（術前・術後：18（PAC併用は4））

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パージェタ（PER）	420（初回840）mg	点滴静注	●																				
トラスツズマブBS（Tmab）	6（初回8）mg/kg	点滴静注	●																				
パクリタキセル（PAC）	80mg/m^2	点滴静注	●							●							●						

【11-23】T-DM1

適用目的	術後・進行再発2nd line以降
施行クール数	PDまで（術後：14）

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カドサイラ（T-DM1）	3.6mg/kg	点滴静注	●																				

【11-30】dose-dense EC-PAC

適用目的	術前・術後
施行ｸｰﾙ数	8(EC*4+PAC*4)

スケジュール

★EC

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エピルビシン(EPI)	90mg/m^2	点滴静注	●													
エンドキサン(CPA)	600mg/m^2	点滴静注	●													

★PAC

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パクリタキセル(PAC)	175mg/m^2	点滴静注	●													

【11-31】CMF

適用目的	術後
施行ｸｰﾙ数	6

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エンドキサン(CPA)	500mg/m^2	点滴静注	●							●																				
メソトレキセート(MTX)	40mg/m^2	点滴静注	●							●																				
5-FU	600mg/m^2	点滴静注	●							●																				

【11-38】イブランス+LET

適用目的	進行再発1st line
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イブランス	125mg	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
フェマーラ(LET)	2.5mg	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

【11-39】イブランス+FUL（+LH-RHアナログ）

適用目的	進行再発2nd line以降
施行クール数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イブランス	125mg	内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
フェソロデックス（FUL）	500mg	筋注	●														●*1													
（LH-RHアナログ）	添付文書参照	皮下注																												

*1：day15は1クール目のみ投与

【11-42】≪TCH≫DOC+CBDCA+Tmab

適用目的	術前・術後・進行再発1st・2nd line以降
施行クール数	PDまで（TCH:6/周術期のメンテナンス：12）

スケジュール（TCH）

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル（DOC）	75mg/m^2	点滴静注	●																				
カルボプラチン（CBDCA）	AUC6	点滴静注	●																				
トラスツズマブBS（Tmab）	2（初回4）mg/kg	点滴静注	●							●							●						

スケジュール（メンテナンス）

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブBS（Tmab）	6mg/kg	点滴静注	●																				

【11-43】PER+Tmab+ハラヴェン臨床研究

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パージェタ（PER）	420（初回840）mg	点滴静注	●																				
トラスツズマブBS（Tmab）	6（初回8）mg/kg	点滴静注	●																				
ハラヴェン	1.4mg/m^2	点滴静注	●							●													

【11-44】ABI+テセントリク

適用目的	進行再発1st line
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アブラキサン（ABI）	100mg/m^2	点滴静注	●							●							●													
テセントリク	840mg	点滴静注	●														●													

【11-45】T-DXd

適用目的	進行再発2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンハーツ（T-DXd）	5.4mg/kg	点滴静注	●																				

【11-46】T-DXd臨床研究

適用目的	進行再発2nd line以降
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エンハーツ（T-DXd）	5.4mg/kg	点滴静注	●																				

【11-47】GEM+CBDCA+キイトルーダ

適用目的	進行再発1st line
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジェムザール（GEM）	1000mg/m^2	点滴静注	●							●													
カルボプラチン（CBDCA）	AUC2	点滴静注	●							●													
キイトルーダ	200mg	点滴静注	●																				

【11-48】PAC+キイトルーダ

適用目的	進行再発1st line
施行ｸｰﾙ数	PDまで

スケジュール

| 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 1週（day1） | | | | | | | 2週（day8） | | | | | | | 3週（day15） | | | | | | | 4週（day22） | | | | | | | 5週（day29） | | | | | | | 6週（day36） | | | | | | | 7週（day43） | | | | | | | 8週（day50） | | | | | | | 9週（day57） | | | | | | | 10週（day64） | | | | | | | 11週（day71） | | | | | | | 12週（day78） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---