

【5-30】mFOLFOXIRI+Bev

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	PDまで(導入療法は12クール目安)

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
カンプト(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	●													
エルプラット(L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	●													
レボホリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	●													
5-FU(46時間持続静注)	2400mg/m ²	点滴静注	●→													
アバステン(Bev)	5mg/kg	点滴静注	●													

【5-31】FOLFIRI+RAM

適用目的	進行再発2nd line以降
施行クール数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
カンプト(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	●													
レボホリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	●													
5-FU(急速静注)	400mg/m ²	点滴静注	●													
5-FU(46時間持続静注)	2400mg/m ²	点滴静注	●→													
サイラムザ(RAM)	8mg/kg	点滴静注	●													

【5-32】Cmab+ENCO+BINI

適用目的	進行再発2nd line以降
施行クール数	PDまで

スケジュール

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7
アービタックス(Cmab)	250(初回400)mg/m ²	点滴静注	●						
ピラフトビ(ENCO)	300mg	内服	●	●	●	●	●	●	●
メクトビ(BINI)	90mg	内服	●	●	●	●	●	●	●