<u>[15−1]TMZ+RT</u>

スケジュール(RT併用)

適用目的	進行再発1st line
施行クール数	RT併用:1/維持・再発:PDまで

薬品名	投与量	投与経路	1	2 :	3 4	1 5	6	7	8	9	10	11	12	13	3 14	1 15	16	3 1	7 1	8 1	9 20	21	22	2 23	3 24	1 2	5 20	6 2	7 28	8 2	9 3	0 3	31	32	33	34	35	36	37	38	3 3	9 4	0 4	↓1 ∠	42	43	44	45 4	46	47	48	49
テモダール(TMZ)*1	75mg/m ²	内服or点滴静注	• (•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•							•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				•			
放射線治療	2Gy	_	• (•	•	•			•	•	•	•	•			•	•						•		•								•	•	•			•	•	•											П	

^{*1:}RT中断によりRTの期間が延長した場合、継続基準を満たしたときに限り7日間延長可

スケジュール(維持療法*2/再発)

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	' 8	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テモダール(TMZ)	150mg/m ^{2*3}	内服or点滴静注	•	•	•	•	•																								

*2:RT併用終了後4週間あける

<u>【15-2】Bev</u> スケジュール

適用目的 進行再発2nd line以降 施行クール数 PDまで

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン(Bev)	10mg/kg	点滴静注	•													

^{*3:} 初回150mg/m2、忍容性が確認できれば次クール200mg/m2に増量可能(初発の維持療法では2クール目に増量できなければ以後の増量なし)

[15-3]TMZ+Bev+RT/TMZ+Bev/Bev

適用目的 進行再発1st line 施行ケール数 RT併用:1/維持:6/単剤:PDまで

スケジュール(RT併用)

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5 (3 7	7 8	3 9	9 1	0 1	1 1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	8 3	9 4	0	41	42	43	44	1 45	5 46	6 4	1 7 4	48 4	9
テモダール(TMZ)*4	75mg/m^2	内服or点滴静注	•	•				•	•					•	•	•	•	•	\bullet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	\bullet								
アバスチン(Bev)	10mg/kg	点滴静注	•														•														•														•			П		T		П	
放射線治療	2Gy	-	•	•					•					•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•)		•	•	•			D										

*4:RT中断によりRTの期間が延長した場合、継続基準を満たしたときに限り7日間延長可

スケジュール(維持療法*5)

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	3 4	1 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テモダール(TMZ)	150mg/m ^{2*6}	内服or点滴静注	•	•	•	•	•																							
アバスチン(Bev)	10mg/kg	点滴静注	•														•													

*5:RT併用終了後4週間あける

*6:初回150mg/m2、忍容性が確認できれば2クール200mg/m2に増量可能

スケジュール(単剤療法)

薬品名	投与量	投与経路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバスチン(Bev)	15mg/kg	点滴静注	•																				